

Anleitung zur Durchführung eines Nasopharyngealabstrichs

PCR-Test zum Nachweis des SARS-CoV-2-Virus


Ein Test zum Nachweis des Coronavirus (SARS-CoV-2) kann aus verschiedenen Materialien durchgeführt werden. Eines davon ist der Nasopharyngealabstrich.



1.) Abstreichende Person soll Schutzkleider tragen (Handschuhe, Kittel, Maske, Schutzbrille).

2.) Patient soll die Maske unter die Nase ziehen und über dem Mund platzieren.

Patient soll Nase schnutzen und ein Taschentuch in der Hand bereithalten (für eventuelles Niesen nach dem Abstrich).





3.) Kopf des Patienten leicht in den Nacken legen und mit nicht dominanter Hand abstützen.

Patienten fragen, durch welches Nasenloch er mehr Luft kriegt: dieses Nasenloch für Abstrich verwenden.

4.) Tupfer fast horizontal entlang der Nasenscheidewand tief in die Nase bis zur Rachenwand (bis zu einem federnden Widerstand resp. ca. 8 cm tief) einführen.

Tupfer dort während ca. 5 Sekunden rotieren und dann herausziehen.



5.) Tupfer in das Transportröhrchen überführen.

6.) Schaft an der Sollbruchstelle abbrechen, Deckel schliessen.

